No. 7 Par m. Laniscard, chir. à Sartas

Depuis le peu de tempa que je pratique la chirurgie j'ay Eu l'agrément de mitre à profit quelqueh observationa que le hazard m'a produit je vais avoir l'honneur de vous En rapporter une qui m'a paru la plus interessente la voicy En précis.

Le nomé Soubiran de la parroisse de berat fut attaqué le 16 du mois de juillet dernier, d'un flux hépatique, quil a porté Environ trente cinq ou quarante jours, cette Excretion ayant cessé tout à coup, le malade fut pris par les plus violents accès de colique, il En à Eté cruilement tourmenté, par les insuportables douleurs quil, n'a cessé de souffrir, qu'appres un long espace de tempa trois jours appres le premier moment des douleurs, je fus mendé pour voir ce malade que je trouvai, avec les simptomes annexes a l'inflamation, du foye, il souffroit Beaucoup de la region epigastrique Sur tout de l'hipocondre droit, la fievre Etoit ardente, la peau de toute l'habitude du corps Seche Et brulente, la Soif inextinguible, Et son urine noiratre Et chargée de flocconi semblables a ses glaires figées voila l'etat dans lequel je trouvai ce malade agé de quarante ans; je m'informai avec son chirurgien ordinaire, quels Eoit les remedes quil avoit mis En usage, il me dit luy avoir donné un doux purgatif, Et deux ou trois lavements Emolieux, et malgré ces remedes, le mal n'avoit jamais donné de relache; Sur ce recit je me determinay à Saignér le malade et dans le cours de la même journée je fis réiterer, deux fois la même Evacuation, je le mis en même tempa à l'usage du petit lait, et de la poudre tempérente; le Soir je luy fis prendre une dose de potion calmente Et huileuse, le jour suivant je fis En core continuer le petit lait auquel j'ajoutay trois Grains de Kermes mineral, ce qui me produisit des Evacuationa et mit un peu d'amandement dans la fievre, cependant malgré, la continuation des lavements cy dessus la resteration de la Saignée l'usage des appozemes delayants Et nitreux la limonade pour Boisson ordinaire, Et l'application des fomentations Et cataplâmes emolieux Sur la partie doulouruse, Enfin la

Académie Nationale de Médecine Bibliothèque
ARC 48 n° 7

methode antiphlogistique avec l'adition des doux minoratif. continua pandant douze jours consecutif, rien ne peut prevenir l'abcès dans le foye; la fluctuation quoyque sourde et obscure, s'est manifestée entre la pointe du cartilage xiphoïde et le rebord cartilagineux des fausses cottes. je fis l'ouverture de ce dépôt en me conforment aux sçavantes remarques de ms. morand; l'incision fut faite a la partie la plus declive de la tumeur, il sortit du foye environ une chopine et demi. de matiere puriforme en partie blanche et en quantité de rougeatre, au premier pentement il en sortit a peu pres la moitié cela se continua de même jusquau troisieme jour ou l'evacuation du pus fut entierement supprimée; arrivé chez mon malade je fus fort etonné de le voir plus mal, son ventre tendu et metéorisé me donnoit a croire que les adherences qu'avoit contractée la face convexe du foye avec le peritoine, etoit sans doute detruites. je pronostiquay pour lors un mauvais presage de la vie du malade, j'avois beau comprimer les parties adjacentes a la tumeur, il n'en sortoit pas pour cela la plus petite partie de pus; coment en seroit il sorty il etoit tout epanché dans la cavité de l'abdomen? quel parti prendre en pareille conjoncture? la bonne chirurgie ne nous offre plus de secours, il faut donc abandonner le malade a son malheureux sort? non; il y a des cas ou la nature cette bonne mere, vient nous tracer de nouvelles indications. voyez un fait. cet homme qui fait le sujet de cette observation, portoit une hernie inguinale l'anneau etoit prodigieusement dilaté par la sortie du sac herniaire et l'intestin qui y etoit contenu, il offroit donc une issue au pus pour former sa collection dans cet endroit, ce qui est arrivé effectivement; le malade m'ayant declaré (d'un ton plaintif) que sa hernie etoit devenue plus grosse et qu'il ressentoit beaucoup de douleur dans cette partie, me fit porter toutes mes attentions, a sa nouvelle maladie. a l'inspection de la tumeur située du coté droit, je fus fort etonné de la trouver

Extremement distendue avec des Signes de fluctuation; apres avoir reflechy Sur le caractere de l'humeur Engouée, je pris le Party de faire une incision, En Suivant la longeur de la tumeur je n'avois pas fini de debrider le Sac qui comencoit detrangler l'intestin quau même instant jeus la Satisfaction de voir Environ une chopine de Pus, Semblable au Premier qui Etoit Sorty par louverture Superieure, je fis rentrer l'intestin Et non le Sac. apres toute cette manœuvre je fis deux injections (avec une decoction dorge, et de graine de lin) par l'incision Superieure, toute la liqueur Sortit par l'inferieure En entrainant de petites parcelles de Pus; j'appliquay Sur la Playe inferieure un Plumaceau imbu de vin miélé et garni dun jaune dœuf Et par dessus un appareil Convenable. Sur la Playe Superieure je mis une compresse trempée dans le vin miélé, cette derniere fut couverte de même que tout labdomen avec dautres compresses trempées dans une decoction mucilagineuse, le pansement a Eté fait de même deux fois le jour, et continué pres de trois Semaines pendant lequel temps j'ay Employé tous les remedes capables de Prevenir l'inflamation tel que les Emulsions nitrées, les crêmes de gruau et de fleurs de ris mais toujours fort claires; ces dernieres Substances ont Eté particulierement mises En usage, pour Soutenir les forces du malade, qui Etoit presque Extenué, par la longueur de la maladie qui a duré deux mois Et demy, au Bout duquel temps il Sest tres Bien retably.

il faut vous faire observé que ce malade fut ressaigné trois fois par le Bras, dans les Six jours Suivants a la derniere opperation; les antiphlogistiques furent administrés, pendant vingt jours consecutifs, apres lequel temps j'ay cessé les injections, Et le pansement des deux Playes fut dans la Suitte executé tout comme pour des Playes Simples jusqua parfaite Guerison. Le malade na plus eu depuis ce temps la, aucun accident de la part de la hernie, le Sac hernieire produit par le prolongement du peritoine; a Sy bien formé une cicatrice

que lanneau sen Est trouvé Exactement fermé.

le foye na plus donné la moindre marque de lezion dans ses fonctions, a la verité le malade y a ressentis de temps En temps quelque douleur passagere; que lusage des Eaux ferrugineuses et vitriolées, ont presque totalement detruites.

voila monsieur le detail de mon observation une meilleure plume que la mienne, lauroit sans doute plus Etendue par beaucoup de lustre mais nayant pas le Bonheur detre lettré; je me contente de Raconter la chose tout simplement, tel que je lay vuë.

En reflechissant sur lexposé de cette observation il faudra convenir, que la Phisique Experimentales et ses connoissances anatomiques, sont indispensables En pareille occurrence, en Effet la premiere nous apprend, que tous les liquides composés de globules pesent indépendament les uns des autres, et que leur gravité les porte naturelement, a se deriver du côté ou il y a le moins de Resistence.
lanatomie nous demontre visiblement que cette resistence a Eté plus foible dans lanneau inguinal, qui a permis la sortie de lintestin, dans la formation de la hernie il sagissoit donc de saisir promptement cette indication urgente, En procurant à la nature le secours que le genie de lart suggere, et par ce moyen Eviter une mort apparente.